

	<h1>PROTOCOLES</h1> <h2>Bain de bouche antiseptique</h2>	Date création 01/04/2026
		Date application 01/04/2026
		Réf
		Version : 1.0

BAIN DE BOUCHE ANTISEPTIQUE AVANT TOUT SOIN

L'utilisation d'un antiseptique en pratique dentaire vise à réduire la flore microbienne buccale, ainsi que la flore cutanée péri-buccale, susceptible d'être à l'origine d'une complication infectieuse liée aux soins.

Avoir à disposition, dans la salle de soins, un flacon d'un bain de bouche antiseptique (chlorhexidine, hexetidine, ammoniums quaternaires, triclosan...).

Prévoir, pour les enfants, capables de cracher, un bain de bouche sans alcool.

Geste de haut niveau de risque : acte chirurgical	Geste de niveau de risque intermédiaire		
<p>1. Bain de bouche</p> <p>2. Application par badigeon sur la zone d'intervention ou irrigations sous gingivales avec l'un des protocoles suivants :</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>1^{er} Amukine® ou Dakin® (Application sans dilution avec une compresse imbibée)</p> <p>2^e Rincer au sérum physiologique stérile ou à l'eau stérile</p> <p>3^e Amukine® ou Dakin® (Application sans dilution avec une compresse imbibée)</p> </td><td> <p>1^{er} Bétadine® bain de bouche dilué</p> <p>2^e Rincer au sérum physiologique stérile ou à l'eau stérile</p> <p>3^e Bétadine® dermique en application (zone péri-buccale)</p> </td></tr> </table> <p>L'efficacité de ces 2 protocoles est équivalente</p>	<p>1^{er} Amukine® ou Dakin® (Application sans dilution avec une compresse imbibée)</p> <p>2^e Rincer au sérum physiologique stérile ou à l'eau stérile</p> <p>3^e Amukine® ou Dakin® (Application sans dilution avec une compresse imbibée)</p>	<p>1^{er} Bétadine® bain de bouche dilué</p> <p>2^e Rincer au sérum physiologique stérile ou à l'eau stérile</p> <p>3^e Bétadine® dermique en application (zone péri-buccale)</p>	<p>1. Bain de bouche</p> <p>Tout produits de soins de bouche selon les indications du laboratoire pharmaceutique.</p>
<p>1^{er} Amukine® ou Dakin® (Application sans dilution avec une compresse imbibée)</p> <p>2^e Rincer au sérum physiologique stérile ou à l'eau stérile</p> <p>3^e Amukine® ou Dakin® (Application sans dilution avec une compresse imbibée)</p>	<p>1^{er} Bétadine® bain de bouche dilué</p> <p>2^e Rincer au sérum physiologique stérile ou à l'eau stérile</p> <p>3^e Bétadine® dermique en application (zone péri-buccale)</p>		
Modalités de réalisation de l'antisepsie en fonction du niveau de risque infectieux lié à l'acte.			

Les précautions générales d'utilisation des antiseptiques sont à respecter :

- Proscrire les mélanges et rester dans la même gamme de principes actifs lors de la réalisation de soins successifs (exemple : bains de bouche suivis de badigeonnage)
- Ne pas déconditionner, ni transvaser
- Utiliser de préférence les petits conditionnements ou des doses unitaires. Les monodoses sont indispensables pour les solutions aqueuses qui se contaminent fréquemment.



Verre de bain de bouche préparé.

Pas de crachoir

ORGANISER DANS LA MESURE DU POSSIBLE DANS LES TOILETTES DE LA SALLE D'ATTENTE LA MISE EN PLACE DU BAIN DE BOUCHE ANTISEPTIQUE POUR CHAQUE PATIENT

OU

UTILISEZ LA CANULE D'ASPIRATION APRES AVOIR FAIT LE BAIN DE BOUCHE